

# Protocolo LT



## Dr. Luis Assis e Dr. Tadaaki Yamada

### *Conceito*

O edema malar é uma condição muito comum, caracterizada pelo aumento de líquido na região SOOF. Ela apresenta um aumento volumétrico, de aspecto molhado entre o ligamento retentor orbital e o zigomático cutâneo. Esta situação aflige muitos pacientes e tem difícil controle.

### *Descrição*

A principal ideia é gerar energia na região do acúmulo de líquido (edema) que gerará uma reação inflamatória e uma fusão das paredes com um consequente fechamento da loja e diminuição do acúmulo de líquido. A partir da primeira sessão já é possível notar resultados. Sugere-se de 1 a 3 sessões com intervalos de 3 semanas. A primeira sessão poderá ser feita junto ao Full Face

### *Avaliação da aplicação*

Pacientes que apresentem edema malar constitucional, não relacionado a preenchimento com ácido hialurônico são indicados.

*Signature*

# Protocolo LT



## Dr. Luis Assis e Dr. Tadaaki Yamada

### *Benefícios*

Segurança, rapidez, conforto, indolor e eficiente. Condição de difícil controle com resultados animadores, sem dor e rapidez através da tecnologia do Liftera V.

Não há período de repouso (downtime) no pós procedimento, não há necessidade de afastamento de atividades e não há alterações de pele nos dias seguintes.

### *Pontos de Atenção*

- Pacientes com histórico de preenchimento com ácido hialurônico na região ou efeito Tyndall deverão ser submetidos à Hialuronidase.
- Pacientes com edema malar constitucional poderá ser submetido ao protocolo com esvaziador ablativo.
- O tratamento é indolor com 1.000 disparos com a caneta, ao todo.

Signature

Liftera®

Assinado por

Dr. Luis Assis e Dr. Tadaaki Yamada

Protocolo  
Protocolo LT



Transdutor	Level	Speed	Meia Face	Total Caneta
Caneta 3.0	7J	7Hz	250	500
Caneta 2.0	5J	7Hz	250	500
			<b>Total</b>	<b>1000</b>

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Liftera®