Liftera®

Custom packs

DASH DOT DASH

Evolua a inteligência do seu Liftera

POWERED BY **ENTERA**

Liftera®

Custom packs

Em 2026, o Liftera apresenta os **Custom Packs**. Desenvolvidos para ampliar a versatilidade dos tratamentos e potencializar resultados clínicos.

O primeiro lançamento

DASH DOT DASH

O que é DASH DOT DAST?

Um novo **padrão de disparo que combina ponto e traço** em um único tratamento.

DASH DOT DASH

Liftera®
Custom packs

Diferenciais

Maior cobertura da área tratada

Distribuição de energia **mais uniforme**

Aumento da **densidade energética** no tecido

Otimização do **tempo de procedimento**

DOT | (~65°C)

Necrose coagulativa

Estímulo à neocolagênese

Efeito Lifting - Sustentação e reposicionamento Tecidual

DASH | (até ~55°C)

Estímulo dérmico difuso

Potencializa a sustentação tecidual em planos profundos (SMAS)

Bulk Heating– Redução de adipócitos (células de gordura)

Potencializa neocolagênese em energias mais baixas quando aplicado na derme

POWERED BY **ENTERA**

DASH DOT DASH

Liftera®
Custom packs

O que promove?

Reduz o ‘vazio térmico’ previamente existente, **aumentando a área efetiva de interação e promovendo um gradiente térmico mais uniforme**. Intensifica-se o efeito de difusão, relevante em casos de gordura localizada ou flacidez mais acentuada.

Amplia a densidade de energia por área: beneficia os tratamentos, seja no excesso de gordura quando atua no subcutâneo, quanto na flacidez mais acentuada em planos mais profundos (SMAS).

Em energias mais baixas, na região de derme reticular, potencializa a neocolagênese.

POWERED BY **ENTERA**

DASH
DOT
DASH

Liftera®
Custom packs

DOT

UDP 2.0 (65°)

Entrega de energia **baseada em aquecimento progressivo sequencial,** promovendo pontos de coagulação térmica controlados.

MODO DE COAGULAÇÃO 2.0

Coagulação precisa

Estímulo dérmico

Efeito lifting localizado

Foco principal: contração tecidual e firmeza

DOT | UDP 2.0 - 65°

Pré-aquecimento

Coagulação

Difusão Térmica TDIP

POWERED BY **ENTERA**

DASH
DOT
DASH

Liftera®
Custom packs

DASH

Efeito Bulking (~55°C)

A pele contém uma rede de tecido conjuntivo frouxo que se estende da epiderme à derme,

passando pela gordura subcutânea e pela fáscia.

Uma das causas da flacidez é o enfraquecimento dessa **rede de tecido conjuntivo devido ao envelhecimento**. Portanto, é muito importante realizar o aquecimento em massa para desnaturar termicamente e reconstruir os tecidos conjuntivos frouxos enfraquecidos no tratamento da flacidez.

O aquecimento em massa é semelhante a um aquecimento sustentado em temperaturas relativamente mais baixas por um longo período, favorecendo a modulação térmica progressiva dos tecidos.

DASH DOT DASH

POWERED BY **ENTERA**

PROTOCOLOS

DASH DOT DASH

PROTOCOLOS AVANÇADOS

DASH PROTECT

Protocolo em 3 sessões voltado a pacientes que iniciarão ou estão em tratamentos de perda de peso, abrangendo face, papada e pescoço.

DASH LIFT

Full Face Standard e Skinny Face.

DASH DEEP LIFT

Full Face Heavy Face.

DASH GLOW

Protocolo potencializador de neocolagênese.

DASH SHAPE

Protocolos corporais abrangendo as áreas definidas – flancos, bananinha, culote, abdômen, braços e joelhos. Potentes com menor número de disparos.

DASH DOT DASH

ORIENTAÇÃO

Esta seção apresenta diretrizes de orientação baseadas em diferentes perfis de rosto, ilustrando de forma didática as áreas de aplicação conforme a profundidade tecidual.

Serão destacadas **duas abordagens principais**:

Áreas de lifting e compactação, voltadas à reorganização estrutural e melhora da sustentação tecidual, e **áreas de estímulo dérmico,** com foco na indução de resposta biológica e qualidade cutânea.

A definição da profundidade para **estratégias de lifting e compactação deve ser sempre individualizada**, considerando a avaliação clínica detalhada e as variações na espessura cutânea.

Adicionalmente, serão identificadas estruturas anatômicas relevantes para o planejamento seguro e eficaz:

FTSL (Fáscia Temporal Superficial Lateral)

SMAS (Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial)

Skinny face

A profundidade para lifting e compactação deve ser individualizada, considerando a avaliação clínica e a espessura cutânea.







Área de lifting e compactação





Área de estimulo dérmico

FTSL
Fáscia temporal
Superficial Lateral

SMAS
Sistema
Musculoaponeurótico
Superficial

Profundidades
- 4.5mm
- 3.0mm
- 2.0mm
- 1.5mm

POWERED BY **ENTERA**

Standard face

A profundidade para lifting e compactação deve ser individualizada, considerando a avaliação clínica e a espessura cutânea.







Área de lifting e compactação





Área de estimulo dérmico

FTSL
Fáscia temporal
Superficial Lateral

SMAS
Sistema
Musculoaponeurótico
Superficial

Profundidades
- 4.5mm
- 3.0mm
- 2.0mm
- 1.5mm

POWERED BY **ENTERA**

Heavy face

A profundidade para lifting e compactação deve ser individualizada, considerando a avaliação clínica e a espessura cutânea.







Área de lifting e compactação





Área de estimulo dérmico

FTSL
Fáscia temporal
Superficial Lateral

SMAS
Sistema
Musculoaponeurótico
Superficial

Profundidades
- 4.5mm
- 3.0mm
- 2.0mm
- 1.5mm

POWERED BY **ENTERA**

Linha ligamentar e pontos de sustentação

A profundidade para lifting e compactação deve ser individualizada, considerando a avaliação clínica e a espessura cutânea.



Linha ligamentar



Pontos de sustentação

Nos pontos de sustentação, **recomenda-se o acúmulo controlado de energia, com o objetivo de potencializar o efeito mecânico** sobre a linha ligamentar e otimizar o resultado de lifting.

No entanto, o **médico deve conduzir essa estratégia com cautela, ajustando os parâmetros conforme a tolerância individual do paciente**, a fim de minimizar o risco de desconforto excessivo durante o procedimento.

DASH
DOT
DASH

POWERED BY **ENTERA**

MODO DE APLICAÇÃO

Linha Liftera

Aplicação Estática

Disparo bidirecional

ATENÇÃO

Não movimentar o transdutor durante o disparo.

Disparar somente com o transdutor perfeitamente acoplado à pele.

Não desacoplar o transdutor durante o disparo.

Não disparar consecutivamente no mesmo local.

ORIENTAÇÕES

Disparo estático deve respeitar a distância de 4mm entre os disparos para melhor uniformidade conforme indicado na régua de referência.

Realizar o disparo completo com o transdutor parado.

Para maior aproveitamento durante os tratamentos, recomendamos manter o comprimento da linha (LENGHT) em 25 mm.

Certifique que o transdutor esteja totalmente acoplado durante o disparo.

Linha Liftera

Aplicação Dinâmica

Aplicação lenta

Aplicação moderada



Disparo bidirecional

ATENÇÃO

Para aplicação de forma dinâmica mover o transdutor constantemente.
Não disparar continuamente no mesmo local.

ORIENTAÇÕES

Aplicação dinâmica traz mais velocidade na aplicação e deve seguir algumas orientações.

Caso opte pela aplicação dinâmica, **selecione o intervalo** de disparos e movimentar o transdutor durante toda aplicação.

Mover o handpiece durante o disparo.

Para maior aproveitamento durante os tratamentos, recomendamos manter o comprimento da linha (LENGHT) em 25 mm.

Certifique que o transdutor esteja totalmente acoplado durante o disparo.

Caneta Liftera

Aplicação em vetores

Direção do disparo conforme o movimento da mão





ATENÇÃO

1º Acoplar a Caneta Liftera na pele;
2º Iniciar o movimento;
3º Apertar o botão de disparo.

Sempre movimentar a Caneta Liftera enquanto estiver disparando.

Nunca deixar a Caneta Liftera parada em um mesmo local da pele enquanto dispara.

Ao finalizar o vetor, soltar o botão e então remover a Caneta Liftera, para evitar a superficialização dos pontos de coagulação.

Evitar sobreposição dos vetores.

Evitar acúmulo constante dos disparos em uma região.

ORIENTAÇÕES

As aplicações em vetores são utilizadas para desenhar linhas mais orgânicas de coagulação e contornar a área anatômica com mais precisão.

Os vetores podem ser aplicados paralelamente em uma única direção ou em protocolos cruzados (hashtags).

A distância entre cada vetor é de 3 mm.

Caneta Liftera

Aplicação em vetores





Direção do disparo conforme o movimento da mão





ATENÇÃO

1º Acoplar a Caneta Liftera na pele;
2º Iniciar o movimento;
3º Apertar o botão de disparo.

Sempre movimentar a Caneta Liftera enquanto estiver disparando.

Nunca deixar a Caneta Liftera parada em um mesmo local da pele enquanto dispara.

Ao finalizar o vetor, soltar o botão e então remover a Caneta Liftera, para evitar a superficialização dos pontos de coagulação.

Evitar sobreposição dos vetores.

Em regiões menores e delicadas sugerimos utilizar uma frequência de disparo de 5 Hz.

Não aplicar em direção ao globo ocular

ORIENTAÇÕES

A Caneta Liftera em regiões submandibulares, periorbitais e periorais oferecem mais conforto ao paciente e precisão na aplicação.

Para individualizar e focar nas indicações de cada paciente, acompanhar a anatomia aplicando linhas paralelas e espaçadas de 5 mm.

Caneta Liftera

Aplicação em Moving Technique - Espiral



Direção do disparo conforme o movimento da mão



ATENÇÃO

Sempre movimentar a Caneta Liftera enquanto estiver disparando. Nunca deixar a Caneta parada em um mesmo local da pele enquanto dispara.

Ao finalizar, soltar o botão e então remover a Caneta Liftera, para evitar superficialização.

ORIENTAÇÕES

Aplicação contínua Moving Technique em espiral: Utilizada para concentrar pontos de coagulação em áreas específicas, Tratamento por Difusão Térmica (TDT) e maior consumo de gordura.

Ajustar o parâmetro SPEED para aumentar o número de pontos de coagulação por segundo (5, 7 ou 10 Hz).

Ajustar o tamanho do espiral, movendo o pulso em movimentos circulares menores, para pequenas regiões. Para regiões maiores o movimento circular pode ter maior amplitude.

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT



DASH PROTECT

Protocolo desenvolvido em **3 fases para atendimento de pacientes em tratamento de emagrecimento**. Não se limita ao tratamento das manifestações clínicas, incorporando também uma estratégia preventiva a esse perfil de paciente.

FASE 1

Intervenção antes do início do tratamento de emagrecimento

*Estímulo inicial e prevenção de flacidez

FASE 2A

*Foco em sustentação e neocolagênese

FASE 2B

*Foco em sustentação, compactação de gordura e neocolagênese

Intervenção durante o tratamento de emagrecimento

*Controle da flacidez durante perda de peso ativa

FASE 3

Após término do tratamento de emagrecimento

*Refinamento e tratamento da flacidez

POWERED BY **ENTERA**

O processo de emagrecimento

Nos últimos anos, o uso de agonistas do receptor de GLP-1 (glucagon-like-peptide-1) tem se expandido no tratamento de emagrecimento, com medicamentos como **semaglutide, tirzepatide** e o mais recente retatrutide promovendo **perdas de peso substanciais**.

A **redução rápida de tecido adiposo** pode resultar em alterações **estruturais da pele**, incluindo **flacidez cutânea** e **perda de suporte tecidual**, decorrentes da diminuição do volume subcutâneo e de mudanças na matriz dérmica.

Torna-se cada vez mais relevante a utilização de tecnologias no tratamento desse novo perfil de pacientes, não apenas para o tratamento da flacidez já estabelecida, mas também para adoção de estratégias preventivas – **com objetivo de preservar a qualidade e a sustentação da pele ao longo do processo de perda de peso**.

Agonistas de GLP-1 e GIP

O mecanismo desses medicamentos resulta no emagrecimento pelos seguintes fatores:

Déficit Calórico

A perda do apetite, maior sensação de saciedade e diminuição do esvaziamento gástrico resulta na redução da ingestão de alimentos.

Controle Glicêmico

A melhor regulação da insulina ajuda a prevenir picos de glicose no sangue e diminui a resistência à insulina no adipócito, evitando o surgimento de doenças como o diabetes tipo 2.



POWERED BY ENTERA

O tecido adiposo cenário saudável



Estado metabólico equilibrado: tecido adiposo funciona como um órgão endócrino ativo.

Funções

- Armazenamento seguro de energia
- Secreção de adipocinas regulatórias
- Comunicação metabólica com músculo, fígado e pele
- Características celulares: adipócitos pequenos ou moderados, boa vascularização e baixa inflamação

Esse ambiente favorece

- Fibroblastos funcionais
- Produção normal de colágeno
- Matriz extracelular estável

Mudanças no tecido adiposo

Fonte de imagem: Widgerow et al. 2024

Hipertrofia Estado disfuncional

- Maior atividade inflamatória
- Ambiente metabólico desfavorável = impacto negativo nos fibroblastos adjacentes = diminuição da síntese de colágeno e elastina e degradação da matriz extracelular
- Perda de suporte dérmico
- Atrofia superficial
- Sinais de envelhecimento cutâneo



OPEN FORUM

Cosmetic Medicine

Special Topic

Adipose Tissue, Regeneration, and Skin Health: The Next Regenerative Frontier

Alan D. Widgerow, MBBCH, MMed, FCS, FACS*

Aesthetic Surgery Journal Open Forum
2024, ojae117
Editorial Decision date: November 15, 2024; online publish-ahead-of-print November 26, 2024.
© The Author(s) 2024. Published by Oxford University Press on behalf of The Aesthetic Society.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
https://doi.org/10.1093/asjof/ojae117
www.asjopenforum.com
OXFORD UNIVERSITY PRESS

Abstract
Adipose tissue, or fat compartments, has long been considered a storage depot and an energy source. However, a large part of new research, starting with the discovery of adipose-derived stem cells, has redirected this thinking toward the tremendous regenerative capacity that adipose tissue possesses when it is healthy. This has resulted in multiple technologies being explored with fat as a basis or with fat as a target aiming at the stimulation of new small hyperplastic adipose cells exuding adipokines and encouraging the proliferation of a whole host of progenitor cells that can have positive effects on many organ systems. One of these organ systems is skin, and there is a direct correlation with various fat compartments and skin health. Dermal fat tissue, also known as dermal white adipose tissue, is one such compartment that originates from dermal preadipocytes transdifferentiating into adipocytes and progenitor adipose cells under the right cues. The author of this paper discusses these potential cues, including injectable fillers, fat grafts, and topical formulations, and their capacity to impact skin health through the generation of healthy fat tissue. In addition, small molecules such as glucagon-like peptide-1 peptides and their impact on fat tissue are discussed. Adipose tissue is being recognized as the next regenerative frontier with exciting prospects ahead.

A hipertrofia adipocitária **ocorre quando o organismo não é capaz de gerar adipócitos suficientes**.

Tamanho médio do **adipócito saudável**: 62,3 ± 22,1 micrômetros
Tamanho médio do **adipócito hipertrofiado**: 100,1±3,94 micrômetros

Mudanças no tecido adiposo

O emagrecimento rápido associado ao uso desses medicamentos pode levar a uma perda significativa de gordura facial.

Resultando em:

- Esgotamento da gordura subcutânea
- Mudanças nos níveis de colágeno e elastina
- Redução do suporte estrutural da pele
- Favorece flacidez e aspecto envelhecido

Tratamentos com HIFU (Ultrassom Focalizado de Alta Intensidade) consistem na entrega controlada de energia, estimulando a produção de colágeno e elastina.



www.cosmoderma.org

ScientificScholar® Knowledge is power
Publisher of Scientific Journals

CosmoDerma

Review Article

Semaglutide and the skin: A brief review of dermatologic implications

Arisha Salam[1], Mohammed Salman Hyder[2]

[1]Department of Dermatology, Venereology and Leprosy, Andaman and Nicobar Islands Institute of Medical Sciences, Port Blair, [2]Department of Dermatology, Hairline International Hair and Skin Clinic, Bengaluru, Karnataka, India.

ABSTRACT

Semaglutide, a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist, is widely used for the management of Type II diabetes mellitus. However, its increasing off-label use for rapid weight loss has brought attention to its unintended effects on facial esthetics and skin health. One of the most prominent consequences is "semaglutide face," characterized by facial hollowing, loss of subcutaneous fat, skin sagging, and premature aging due to fat redistribution, collagen depletion, and muscle loss. This article explores the mechanisms by which semaglutide affects the skin and overall appearance, highlighting the accelerated aging process caused by reduced elastin, collagen breakdown, and structural changes in facial anatomy. The clinical presentation of semaglutide-induced facial changes and the available treatment modalities – ranging from dermal fillers, platelet-rich plasma, and

*Corresponding author:
Arisha Salam,
Department of Dermatology,

Trata a flacidez e queda facial associadas a perda de gordura e contribui para a melhora da sustentação

Ação do HIFU no tecido adiposo

O HIFU (Ultrassom Focalizado de Alta Intensidade) também atua no tecido adiposo de forma não invasiva, focando energia em profundidades específicas da gordura subcutânea. **A energia ultrassônica provoca ruptura dos adipócitos, reduzindo o volume de gordura sem danificar a pele ou tecidos adjacentes.**

Principais mecanismos de ação

Efeito térmico
Aumento localizado da temperatura → necrose coagulativa dos adipócitos.

Efeito mecânico
Ondas ultrassônicas geram estresse mecânico e cavitação, rompendo as membranas das células de gordura.

Resposta biológica
Indução de apoptose e autofagia, além de resposta inflamatória com ação de macrófagos, que removem os adipócitos destruídos.



Aesth Plast Surg (2010) 34:577–582
DOI 10.1007/s00266-010-9503-0

ORIGINAL ARTICLE

High-Intensity Focused Ultrasound Effectively Reduces Waist Circumference by Ablating Adipose Tissue from the Abdomen and Flanks: A Retrospective Case Series

Afschin Fatemi · Michael A. C. Kane

Received: 22 January 2010 / Accepted: 9 March 2010 / Published online: 10 April 2010
© Springer Science+Business Media, LLC and International Society of Aesthetic Plastic Surgery 2010

Abstract
Background Currently available technologies for performing aesthetic body sculpting are either noninvasive but require multiple treatments to achieve relatively superficial effects or very effective but also invasive and sometimes associated with serious complications. A new, noninvasive alternative is to ablate adipose tissue using high-intensity focused ultrasound (HIFU). When focused within subcutaneous adipose tissue, HIFU quickly raises the local temperature, resulting in instantaneous cell death via coagulative necrosis within the targeted area but no damage to the surrounding tissue.

lumps ($n = 2$), edema ($n = 1$), and pain ($n = 1$), which resolved spontaneously.
Conclusions The authors conclude from their experience that HIFU represents a safe and effective means for performing noninvasive body sculpting.

Keywords Body sculpting · Chart review · HIFU · High-intensity focused ultrasound · Lipoplasty · Retrospective

A wide range of technologies are currently available for

Resultado: **redução da espessura do tecido adiposo e melhora do contorno corporal.**

POWERED BY **ENTERA**

Ação do HIFU no tecido adiposo



Por que o Liftera é **mais eficiente no tratamento** da gordura

UDP™ 2.0

Unidade Digital de Potência

Controle digital preciso da entrega de energia.

Aquecimento rápido do tecido em 3 etapas, aumentando a eficiência térmica.

Formação de pontos de coagulação até 3x maiores, com maior eficácia e segurança no tratamento.

TDT™

Tratamento por Difusão Térmica

Permite maior densidade de pontos de coagulação em áreas específicas.

Efeito sinérgico: coagulação + acúmulo de calor no tecido.

Estratégia mais eficiente para tratamento de compartimentos de gordura e áreas corporais.

DASH DOT DASH

Sequência de disparos em linha – ponto – linha.

Proporciona maior cobertura da área tratada e distribuição mais uniforme da energia.

Maior densidade de energia em área tecidual.

Metabolização do Adipócito

Elevação térmica rápida ≈ 65°C ou mais no foco

Desnaturação proteica

Colapso estrutural da célula





Efeito altamente **localizado**

Preservação do tecido adjacente

Remoção gradual pelo sistema imune

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

FASE **1**

DASH PROTECT

Protocolo desenvolvido em **3 fases para atendimento de pacientes em tratamento de emagrecimento**. Não se limita ao tratamento das manifestações clínicas, incorporando também uma estratégia preventiva a esse perfil de paciente.

FASE 1

Intervenção antes do início do tratamento de emagrecimento

*Estímulo inicial e prevenção de flacidez

FASE 2A

*Foco em sustentação e neocolagênese

FASE 2B

*Foco em sustentação, compactação de gordura e neocolagênese

Intervenção durante o tratamento de emagrecimento

*Controle da flacidez durante perda de peso ativa

FASE 3

Após término do tratamento de emagrecimento

*Refinamento e tratamento da flacidez

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

Pacientes em processo de emagrecimento

FASE 1

Estímulo inicial e prevenção de flacidez

Corresponde ao início do processo de perda de peso, momento em que ainda há presença significativa de tecido adiposo facial e submentoniano.

Nesta fase, o tratamento concentra-se em face e papada.

O objetivo principal é:

- Iniciar estímulo térmico profundo
- Favorecer o metabolismo do tecido adiposo
- Estimular contração tecidual
- Prevenir a perda precoce de sustentação facial

FASE 1

Estímulo inicial e prevenção de flacidez

Paciente **antes do tratamento** e **com presença de gordura**



DASH PROTECT

FASE 1
Estímulo inicial e prevenção de flacidez

Total de disparos	
Linha	120 a 180
Caneta	1960 a 2640

Linha 4.5



Terço médio e inferior

Modo ▬ • ▬

Level	7 a 9
Hemiface Linha	30 a 45
Total Linha	60 a 90

Caneta 4.5



Retroligamentar

Modo • • •

Level	8 a 10
Hemiface Caneta	400 a 500
Total Caneta	800 a 1000

Caneta 4.5



Infrazigomática *

Modo ▬ • ▬

Level	8 a 10
Hemiface Caneta	150 a 250
Total Caneta	300 a 500

Linha 3.0



Terço médio e inferior

Modo ▬ • ▬

Level	5 a 7
Hemiface Linha	30 a 45
Total Linha	60 a 90

Caneta 3.0



Retroligamentar

Modo • • •

Level	5 a 7
Hemiface Caneta	150 a 250
Total Caneta	300 a 500

Caneta 3.0

Infrazigomática *

Modo ▬ • ▬

Level	5 a 7
Hemiface Caneta	260 a 320
Total Caneta	560 a 640

Dot	• • •
Dash Dot Dash	▬ • ▬

AVALIAÇÃO

*A utilização desta aplicação é opcional na primeira fase, de acordo com avaliação médica, considerando as características individuais do paciente.

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

FASE 1
Estímulo inicial e prevenção de flacidez

Total de disparos	
Linha	-
Caneta	2080 a 2800

Caneta 2.0



Hemiface	
Modo	•••
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	600 a 800
Total Caneta	1200 a 1600

Caneta 2.0



Cauda da sobrancelha	
Modo	•••
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	200 a 260
Total Caneta	400 a 520

Caneta 2.0

Pálpebra inferior	
Modo	•••
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	240 a 340
Total Caneta	480 a 680

ou

Caneta 1.5



Hemiface	
Modo	•••
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	600 a 800
Total Caneta	1200 a 1600

Caneta 1.5

Cauda da sobrancelha	
Modo	•••
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	200 a 260
Total Caneta	400 a 520

Caneta 1.5

Pálpebra inferior	
Modo	•••
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	240 a 340
Total Caneta	480 a 680

Dot	•••
Dash Dot Dash	▬ • ▬

POWERED BY ENTERA

DASH PROTECT

FASE 1
Estímulo inicial e prevenção de flacidez

Total de disparos	
Linha	60
Caneta	2100 a 2700

Linha 4.5



Papada central

Modo	▬ • ▬
Level	7 a 9

Total Linha	30

Caneta 4.5

Papada central e lateral

Modo	• • • / ▬ • ▬
Level	8 a 10
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Linha 3.0



Papada central

Modo	▬ • ▬
Level	5 a 7

Total Linha	30

Linha 3.0



Papada central e lateral

Modo	• • • / ▬ • ▬
Level	5 a 7
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Caneta 1.5



Papada central e lateral

Modo	• • • / ▬ • ▬
Level	3 a 5
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Dot	• • •
Dash Dot Dash	▬ • ▬

AVALIAÇÃO

Avaliar a prega cutânea para uso da profundidade de 7.0mm

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

FASE **2**

DASH PROTECT

Protocolo desenvolvido em **3 fases para atendimento de pacientes em tratamento de emagrecimento**. Não se limita ao tratamento das manifestações clínicas, incorporando também uma estratégia preventiva a esse perfil de paciente.

FASE 1

Intervenção antes do início do tratamento de emagrecimento

Estímulo inicial e prevenção de flacidez

FASE 2A

Foco em sustentação e neocolagênese

FASE 2B

Foco em sustentação, compactação de gordura e neocolagênese

Intervenção durante o tratamento de emagrecimento

Controle da flacidez durante perda de peso ativa

FASE 3

Após término do tratamento de emagrecimento

Refinamento e tratamento da flacidez

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

FASE **2A** e **2B**

Controle Flacidez Durante Perda de Peso (A) e ou Compactação de Gordura Remanescente (B)

FASE **2A** e **2B**

Foco em sustentação e neocolagênese e ou foco em sustentação, compactação de gordura e neocolagênese

Durante a fase de emagrecimento ativo, ocorre redução mais significativa do compartimento adiposo facial e cervical, podendo surgir sinais iniciais de flacidez. Nesta etapa, o protocolo passa a incluir **face, papada e pescoço,** ampliando a área de tratamento para acompanhar a redistribuição e redução dos tecidos.

O objetivo principal é:

- Manter suporte estrutural da face
- Estimular retração do tecido submentoniano
- Prevenir a acentuação da flacidez cervical

A associação de diferentes profundidades permite atuar simultaneamente no tecido adiposo e na sustentação cutânea.

DASH PROTECT

FASE **2A** e **2B**

Controle Flacidez Durante Perda de Peso (A) e ou Compactação de Gordura Remanescente (B)

Paciente **durante o tratamento de perda de gordura**

2A Foco em sustentação e neocolagênese

2B Foco em sustentação, compactação de gordura e neocolagênese

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

FASE **2A**

DASH PROTECT

Protocolo desenvolvido em **3 fases para atendimento de pacientes em tratamento de emagrecimento**. Não se limita ao tratamento das manifestações clínicas, incorporando também uma estratégia preventiva a esse perfil de paciente.

FASE 1

Intervenção antes do início do tratamento de emagrecimento

Estímulo inicial e prevenção de flacidez

FASE 2A

Foco em sustentação e neocolagênese

FASE 2B

Foco em sustentação, compactação de gordura e neocolagênese

Intervenção durante o tratamento de emagrecimento

Controle da flacidez durante perda de peso ativa

FASE 3

Após término do tratamento de emagrecimento

Refinamento e tratamento da flacidez

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

FASE 2A
Controle Flacidez Durante Perda de Peso

Total de disparos	
Linha	80 a 120
Caneta	1000 a 1400

Linha 4.5



Retroligamentar

Modo	— • —
Level	7 a 9
Hemiface Linha	20 a 30
Total Linha	40 a 60

Caneta 4.5



Retroligamentar

Modo	• • •
Level	8 a 10
Hemiface Caneta	250 a 350
Total Caneta	500 a 700

Linha 3.0



Retroligamentar

Modo	— • —
Level	5 a 7
Hemiface Linha	20 a 30
Total Linha	40 a 60

Caneta 3.0



Retroligamentar

Modo	• • •
Level	5 a 7
Hemiface Caneta	250 a 350
Total Caneta	500 a 700

Dot	• • •
Dash Dot Dash	— • —

ATENÇÃO

Atenção para realizar aplicação a 1cm da base mandibular, preservando o nervo marginal da mandíbula

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

FASE 2A
Controle Flacidez Durante Perda de Peso

Total de disparos	
Linha	-
Caneta	2160 a 2440

Caneta 3.0



Linha Ligamentar

Modo	▬ • ▬
Level	5 a 7
Hemiface Caneta	200
Total Caneta	400

Caneta 2.0



Hemiface

Modo	• • •
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	680 a 820
Total Caneta	1360 a 1640

Caneta 2.0



Linha Ligamentar

Modo	▬ • ▬
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	200
Total Caneta	400

ou

Caneta 1.5



Hemiface

Modo	• • •
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	680 a 820
Total Caneta	1360 a 1640

Caneta 1.5



Linha Ligamentar

Modo	▬ • ▬
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	200
Total Caneta	400

A profundidade para tratamento dos ligamentos deve ser individualizada, considerando a avaliação clínica e a espessura cutânea.

Dot	• • •
Dash Dot Dash	▬ • ▬

AVALIAÇÃO

*A utilização desta aplicação é opcional, de acordo com avaliação médica, considerando as características individuais do paciente.

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

FASE 2A
Controle Flacidez Durante Perda de Peso

Total de disparos	
Linha	30
Caneta	1400 a 1800

Caneta 2.0



Papada central e lateral

Modo ••• — • —

Level	3 a 5
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Linha 1.5



Papada central

Modo •••

Level	3 a 5

Total Linha	30

Caneta 1.5



Papada central e lateral

Modo ••• — • —

Level	3 a 5
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Dot	•••
Dash Dot Dash	— • —

POWERED BY ENTERA

DASH PROTECT

FASE 2A
Controle Flacidez Durante Perda de Peso

Total de disparos	
Linha	-
Caneta	2480 a 2880

Caneta 2.0



Pescoço

Modo	•••
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	620 a 720
Total Caneta	1240 a 1440

Caneta 1.5



Pescoço

Modo	•••
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	620 a 720
Total Caneta	1240 a 1440

Dot	•••
Dash Dot Dash	▬ • ▬

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

Compactação de Gordura Remanescente
e Controle da Flacidez

FASE **2B**

DASH PROTECT

Protocolo desenvolvido em **3 fases para atendimento de pacientes em tratamento de emagrecimento**. Não se limita ao tratamento das manifestações clínicas, incorporando também uma estratégia preventiva a esse perfil de paciente.

FASE 1

Intervenção antes do início do tratamento de emagrecimento

Estímulo inicial e prevenção de flacidez

FASE 2A

Foco em sustentação e neocolagênese

FASE 2B

Foco em sustentação, compactação de gordura e neocolagênese

Intervenção durante o tratamento de emagrecimento

Controle da flacidez durante perda de peso ativa

FASE 3

Após término do tratamento de emagrecimento

Refinamento e tratamento da flacidez

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

FASE 2B
Compactação de Gordura Remanescente e Controle da Flacidez

Total de disparos	
Linha	80 a 120
Caneta	2520 a 3080

Linha 4.5



Retroligamentar

Modo ▬ • ▬

Level	7 a 9
Hemiface Linha	20 a 30
Total Linha	40 a 60

Caneta 4.5

Terço médio e inferior

Modo • • •

Level	8 a 10
Hemiface Caneta	350 a 450
Total Caneta	700 a 900

Caneta 4.5

Infrazigomática

Modo ▬ • ▬

Level	8 a 10
Hemiface Caneta	280 a 320
Total Caneta	560 a 640

Linha 3.0



Retroligamentar

Modo ▬ • ▬

Level	5 a 7
Hemiface Linha	20 a 30
Total Linha	40 a 60

Caneta 3.0



Terço Médio e Inferior

Modo • • •

Level	5 a 7
Hemiface Caneta	350 a 450
Total Caneta	700 a 900

Caneta 3.0

Infrazigomática

Modo ▬ • ▬

Level	5 a 7
Hemiface Caneta	280 a 320
Total Caneta	560 a 640

Dot	• • •
Dash Dot Dash	▬ • ▬

AVALIAÇÃO

*A utilização desta aplicação é opcional, de acordo com avaliação médica, considerando as características individuais do paciente.

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

FASE 2B
Compactação de Gordura Remanescente e Controle da Flacidez

Total de disparos	
Linha	-
Caneta	2160 a 2440

Caneta 3.0



Linha Ligamentar

Modo	— • —
Level	5 a 7
Hemiface Caneta	200
Total Caneta	400

Caneta 2.0



Hemiface

Modo	• • •
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	680 a 820
Total Caneta	1360 a 1640

Caneta 2.0



Linha Ligamentar

Modo	— • —
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	200
Total Caneta	400

ou

Caneta 1.5



Hemiface

Modo	• • •
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	680 a 820
Total Caneta	1360 a 1640

Caneta 1.5

Linha Ligamentar

Modo	— • —
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	200
Total Caneta	400

Dot	• • •
Dash Dot Dash	— • —

AVALIAÇÃO

*A utilização desta aplicação é opcional, de acordo com avaliação médica, considerando as características individuais do paciente.

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

FASE 2B
Compactação de Gordura Remanescente e Controle da Flacidez

Total de disparos	
Linha	60
Caneta	2100 a 2700

Linha 4.5

Papada central

Modo	▬ • ▬
Level	7 a 9

Total Linha	30

Caneta 4.5

Papada central e lateral

Modo	••• / ▬ • ▬
Level	8 a 10
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Linha 3.0



Papada central

Modo	▬ • ▬
Level	5 a 7

Total Linha	30

Caneta 3.0



Papada central e lateral

Modo	••• / ▬ • ▬
Level	5 a 7
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Caneta 1.5



Papada central e lateral

Modo	••• / ▬ • ▬
Level	3 a 5
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Dot	•••
Dash Dot Dash	▬ • ▬

AVALIAÇÃO

Avaliar a prega cutânea para uso da profundidade de 4.5 mm e 7.0mm

POWERED BY ENTERA

DASH PROTECT

FASE 2B
Compactação de Gordura Remanescente e Controle da Flacidez

Total de disparos	
Linha	-
Caneta	3720 a 4320

Caneta 3.0



Pescoço

Modo	●●●
Level	5 a 7
Hemiface Caneta Pescoço lateral	620 a 720
Total Caneta	1240 a 1440

Caneta 2.0



Pescoço

Modo	●●●
Level	3 a 5
Hemiface Caneta Pescoço lateral	620 a 720
Total Caneta	1240 a 1440

Caneta 1.5



Pescoço

Modo	●●●
Level	3 a 5
Hemiface Caneta Pescoço lateral	620 a 720
Total Caneta	1240 a 1440

Dot	●●●
Dash Dot Dash	▬●▬

AVALIAÇÃO

A escolha da profundidade de 3,0 mm deve considerar a espessura cutânea, conforme avaliação clínica.

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

Refinamento e Tratamento de Flacidez

FASE **3**

DASH PROTECT

Protocolo desenvolvido em **3 fases para atendimento de pacientes em tratamento de emagrecimento**. Não se limita ao tratamento das manifestações clínicas, incorporando também uma estratégia preventiva a esse perfil de paciente.

FASE 1

Intervenção antes do início do tratamento de emagrecimento

Estímulo inicial e prevenção de flacidez

FASE 2A

Foco em sustentação e neocolagênese

FASE 2B

Foco em sustentação, compactação de gordura e neocolagênese

Intervenção durante o tratamento de emagrecimento

Controle da flacidez durante perda de peso ativa

FASE 3

Após término do tratamento de emagrecimento

Refinamento e tratamento da flacidez

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

Pacientes em Processo de Emagrecimento

FASE **3**

Refinamento e tratamento da flacidez

Na fase final do processo de emagrecimento, a redução do volume adiposo encontra-se mais estabilizada, e o principal desafio passa a ser a flacidez tecidual.

O protocolo mantém o **tratamento de face, papada e pescoço**, porém com maior ênfase em profundidades voltadas à estimulação dérmica.

O objetivo principal é:

- Promover retração cutânea
- Estimular neocolagênese
- Melhorar firmeza e qualidade da pele
- Refinar o contorno cervicofacial

Essa etapa busca otimizar o resultado estético após a perda de peso.
Em caso de flacidez persistente, os **protocolos DASH LIFT / DASH DEEP LIFT poderão ser realizados complementarmente**

DASH PROTECT

FASE **3**

Refinamento e Tratamento de Flacidez

Paciente ao **final do tratamento** com **perda total de gordura**

POWERED BY **ENTERA**

POWERED BY **ENTERA**

DASH PROTECT

Refinamento e Tratamento de Flacidez

FASE **3**

DASH PROTECT

FASE 3
Refinamento e Tratamento de Flacidez

Total de disparos	
Linha	-
Caneta	3000 a 3800

Caneta 2.0



Hemiface

Modo ▬ • ▬

Level	1 a 3
Hemiface Caneta	500 a 600
Total Caneta	1000 a 1200

Caneta 2.0



Linha ligamentar

Modo • • • ▬ • ▬

Level	3 a 5
Hemiface Caneta	100 a 200
Total Caneta	200 a 400

Caneta 2.0



Pontos de sustentação

Modo • • • ▬ • ▬

Level	3 a 5
Hemiface Caneta	150
Total Caneta	300

Caneta 1.5



Hemiface

Modo ▬ • ▬

Level	1 a 3
Hemiface Caneta	500 a 600
Total Caneta	1000 a 1200

Caneta 1.5



Linha ligamentar

Modo • • • ▬ • ▬

Level	3 a 5
Hemiface Caneta	100 a 200
Total Caneta	200 a 400

Caneta 1.5



Pontos de sustentação

Modo • • • ▬ • ▬

Level	3 a 5
Hemiface Caneta	150
Total Caneta	300

Nos pontos de sustentação, recomenda-se o acúmulo controlado de energia, com o objetivo de potencializar o efeito mecânico sobre a linha ligamentar e otimizar o resultado de lifting. No entanto, o médico deve conduzir essa estratégia com cautela, ajustando os parâmetros conforme a tolerância individual do paciente, a fim de minimizar o risco de desconforto excessivo durante o procedimento.

Ligamentos

Dot - Menor Flacidez
Dash Dot Dash - Maior Flacidez

Dot	• • •
Dash Dot Dash	▬ • ▬

AVALIAÇÃO

A profundidade para tratamento dos ligamentos deve ser individualizada, considerando a avaliação clínica e a espessura cutânea.

DASH PROTECT

FASE 3
Refinamento e Tratamento de Flacidez

Total de disparos	
Linha	20
Caneta	2100 a 2700

Linha 3.0



Papada central

Modo	— • —
Level	5 a 7

Total Linha	20

Caneta 3.0



Papada central e lateral

Modo	• • • / — • —
Level	5 a 7
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Caneta 2.0



Papada central e lateral

Modo	— • —
Level	1 a 3
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Caneta 1.5



Papada central e lateral

Modo	— • —
Level	1 a 3
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Dot	• • •
Dash Dot Dash	— • —

AVALIAÇÃO

*A utilização desta aplicação é opcional, de acordo com avaliação médica, considerando as características individuais do paciente. Avaliar o grau de flacidez para indicação da profundidade de 3,0 mm.

DASH PROTECT

FASE 3
Refinamento e Tratamento de Flacidez

Total de disparos	
Linha	-
Caneta	2480 a 2880

Caneta 2.0



Pescoço

Modo	— • —
Level	1 a 3
Hemiface Caneta Pescoço lateral	620 a 720
Total Caneta	1240 a 1440

Caneta 1.5



Pescoço

Modo	— • —
Level	1 a 3
Hemiface Caneta Pescoço lateral	620 a 720
Total Caneta	1240 a 1440

Dot	• • •
Dash Dot Dash	— • —

AVALIAÇÃO
Avaliar o grau de flacidez para indicação da profundidade de 3,0 mm.

POWERED BY **ENTERA**

DASH-LIFT

Skinny & Standard face



DASH LIFT

Skinny & Standard face

Protocolos sugeridos para tratamento de pacientes com **perfil de rosto skinny ou standard face**.
O **DASH DOT DASH** proporciona mais opções de personalização de tratamentos.
Especialmente em pacientes que precisam de entrega de energia com maior potência.

Os protocolos contemplam **face e papada**.

O objetivo principal é:

- Estímulo térmico
- Contração tecidual e efeito lifting
- Melhora da sustentação facial

POWERED BY **ENTERA**

DASH-LIFT

Skinny face

DASH LIFT

Skinny face

Total de disparos	
Linha	80 a 120
Caneta	1360 a 2040

Linha 4.5



ou

Retroligamentar	
Modo	— • —
Level	5 a 7
Hemiface Linha	20 a 30
Total Linha	40 a 60

Caneta 4.5



Retroligamentar	
Modo	• • •
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	340 a 510
Total Caneta	680 a 1020

Linha 3.0



+

Retroligamentar	
Modo	— • —
Level	3 a 5
Hemiface Linha	20 a 30
Total Linha	40 a 60

Caneta 3.0



Retroligamentar	
Modo	• • •
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	340 a 510
Total Caneta	680 a 1020

Dot	• • •
Dash Dot Dash	— • —

DASH LIFT

Skinny face

Total de disparos	
Linha	-
Caneta	3000 a 3800

Caneta 2.0



Hemiface

Modo

Level	1 a 3
Hemiface Caneta	500 a 600
Total Caneta	1000 a 1200

Caneta 2.0



Linha ligamentar

Modo

Level	3 a 5
Hemiface Caneta	100 a 200
Total Caneta	200 a 400

Caneta 2.0



Pontos de sustentação

Modo

Level	3 a 5
Hemiface Caneta	150
Total Caneta	300

Caneta 1.5



Hemiface

Modo

Level	1 a 3
Hemiface Caneta	500 a 600
Total Caneta	1000 a 1200

Caneta 1.5



Linha ligamentar

Modo

Level	3 a 5
Hemiface Caneta	100 a 200
Total Caneta	200 a 400

Caneta 1.5



Pontos de sustentação

Modo

Level	3 a 5
Hemiface Caneta	150
Total Caneta	300

Nos pontos de sustentação, recomenda-se o acúmulo controlado de energia, com o objetivo de potencializar o efeito mecânico sobre a linha ligamentar e otimizar o resultado de lifting. No entanto, o médico deve conduzir essa estratégia com cautela, ajustando os parâmetros conforme a tolerância individual do paciente, a fim de minimizar o risco de desconforto excessivo durante o procedimento.

Ligamentos

Dot - Menor Flacidez
Dash Dot Dash - Maior Flacidez

Dot	•••
Dash Dot Dash	▬ • ▬

AVALIAÇÃO

A profundidade para tratamento dos ligamentos deve ser individualizada, considerando a avaliação clínica e a espessura cutânea.

DASH LIFT

Skinny face

Total de disparos	
Linha	20
Caneta	2100 a 2700

Caneta 3.0



Papada central

Modo	•••
Level	5 a 7

Total Caneta	20

Caneta 3.0



Papada central e lateral

Modo	••• — • —
Level	5 a 7
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Caneta 1.5 ou 2.0

Papada central e lateral

Modo	•••
Level	1 a 3
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Caneta 1.5 ou 2.0



Papada central e lateral

Modo	•••
Level	1 a 3
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Dot	•••
Dash Dot Dash	— • —

AVALIAÇÃO

*A profundidade para tratamento dos ligamentos deve ser individualizada, considerando a avaliação clínica e a espessura cutânea. Avaliar o grau de flacidez para indicação da profundidade de 3,0 mm.

POWERED BY **ENTERA**

DASH-LIFT

Standard face



DASH LIFT

Standard face

Total de disparos	
Linha	80 a 120
Caneta	1400 a 1800

Linha 4.5



Retroligamentar

Modo	— • —
Level	7 a 9
Hemiface Linha	20 a 30
Total Linha	40 a 60

Caneta 4.5



Terço médio e inferior

Modo	• • •
Level	8 a 10
Hemiface Caneta	350 a 450
Total Caneta	700 a 900

Linha 3.0



Retroligamentar

Modo	— • —
Level	5 a 7
Hemiface Linha	20 a 30
Total Linha	40 a 60

Caneta 3.0



Terço médio e inferior

Modo	• • •
Level	5 a 7
Hemiface Caneta	350 a 450
Total Caneta	700 a 900

Dot	• • •
Dash Dot Dash	— • —

DASH LIFT

Standard face

Total de disparos	
Linha	-
Caneta	3920 a 4480

Caneta 3.0



Linha Ligamentar

Modo	— • —
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	200
Total Caneta	400

Caneta 2.0



Hemiface

Modo	— • —
Level	1 a 3
Hemiface Caneta	680 a 820
Total Caneta	1360 a 1640

Caneta 2.0



Linha Ligamentar

Modo	— • —
Level	1 a 3
Hemiface Caneta	200
Total Caneta	400

Caneta 1.5



Hemiface

Modo	— • —
Level	1 a 3
Hemiface Caneta	680 a 820
Total Caneta	1360 a 1640

Caneta 1.5



Linha ligamentar

Modo	— • —
Level	1 a 3
Hemiface Caneta	200
Total Caneta	400

Dot	• • •
Dash Dot Dash	— • —

AVALIAÇÃO

*A utilização desta aplicação é opcional, de acordo com avaliação médica, considerando as características individuais do paciente.

POWERED BY **ENTERA**

DASH LIFT

Standard face

Total de disparos	
Linha	60
Caneta	2100 a 2700

Linha 4.5



Papada central

Modo	
Level	7 a 9

Total Linha	30

Caneta 4.5

Papada central e lateral

Modo	
Level	8 a 10
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Linha 3.0



Papada central

Modo	
Level	5 a 7

Total Linha	30

Caneta 3.0



Papada central e lateral

Modo	
Level	5 a 7
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Caneta 1.5



Papada central e lateral

Modo	
Level	3 a 5
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Dot	•••
Dash Dot Dash	▬ • ▬

AVALIAÇÃO

Avaliar a prega cutânea para uso da profundidade de 7.0mm

POWERED BY **ENTERA**

POWERED BY **ENTERA**

DASH DEEP LIFT

Heavy face



DASH DEEP LIFT

Heavy face

Protocolos sugeridos para tratamento de pacientes com **perfil de rosto heavy face**.
O **DASH DOT DASH** proporciona mais opções de personalização de tratamentos.
Especialmente em pacientes que precisam de entrega de energia com maior potência.

Os protocolos contemplam **face e papada**.

O objetivo principal é:

- Estímulo térmico
- Compactação do tecido adiposo
- Contração tecidual e efeito lifting
- Melhora da sustentação facial

POWERED BY **ENTERA**

DASH DEEP LIFT

Heavy face

DASH DEEP LIFT

Heavy face

Total de disparos	
Linha	120 a 180
Caneta	2680 a 3280

Linha 4.5



Terço médio e Inferior

Modo	— • —
Level	7 a 9
Hemiface Linha	30 a 45
Total Linha	60 a 90

Caneta 4.5

Terço médio e inferior

Modo	• • •
Level	8 a 10
Hemiface Caneta	400 a 500
Total Caneta	800 a 1000

Caneta 4.5

Infrazigomática

Modo	— • —
Level	8 a 10
Hemiface Caneta	280 a 320
Total Caneta	560 a 640

Linha 3.0



Terço médio e Inferior

Modo	— • —
Level	5 a 7
Hemiface Linha	30 a 45
Total Linha	60 a 90

Caneta 3.0

Terço Médio e Inferior

Modo	• • •
Level	5 a 7
Hemiface Linha	400 a 500
Total Linha	800 a 1000

Caneta 3.0

Infrazigomática

Modo	— • —
Level	5 a 7
Hemiface Linha	260 a 320
Total Linha	520 a 640

Dot	• • •
Dash Dot Dash	— • —

AVALIAÇÃO

*A utilização desta aplicação é opcional, de acordo com avaliação médica, considerando as características individuais do paciente.

POWERED BY **ENTERA**

DASH DEEP LIFT

Heavy face

Total de disparos	
Linha	-
Caneta	2080 a 2800

Caneta 2.0

Hemiface

Modo	▬ • ▬
Level	1 a 3
Hemiface Caneta	600 a 800
Total Caneta	1200 a 1600

Caneta 2.0



Cauda da sobrancelha

Modo	• • •
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	200 a 260
Total Caneta	400 a 520

Caneta 2.0

Pálpebra inferior

Modo	• • •
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	240 a 340
Total Caneta	480 a 680

ou

Caneta 1.5



Hemiface

Modo	▬ • ▬
Level	1 a 3
Hemiface Caneta	600 a 800
Total Caneta	1200 a 1600

Caneta 1.5

Cauda da sobrancelha

Modo	• • •
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	200 a 260
Total Caneta	400 a 520

Caneta 1.5

Pálpebra inferior

Modo	• • •
Level	3 a 5
Hemiface Caneta	240 a 340
Total Caneta	480 a 680

Dot	• • •
Dash Dot Dash	▬ • ▬

POWERED BY **ENTERA**

DASH DEEP LIFT

Heavy face

Total de disparos	
Linha	60
Caneta	2100 a 2700

Linha 4.5

Papada central

Modo	▬ • ▬
Level	7 a 9

Total Linha	30

Caneta 4.5

Papada central e lateral

Modo	••• ▬ • ▬
Level	8 a 10
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Linha 3.0



Papada central

Modo	▬ • ▬
Level	5 a 7

Total Linha	30

Caneta 3.0



Papada central e lateral

Modo	••• ▬ • ▬
Level	5 a 7
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Caneta 1.5



Papada central e lateral

Modo	••• ▬ • ▬
Level	3 a 5
Total Caneta Papada central	300 a 500
Hemiface Caneta Papada lateral	200
Total Caneta Papada lateral	400

Dot	•••
Dash Dot Dash	▬ • ▬

AVALIAÇÃO

Avaliar a prega cutânea para uso da profundidade de 7.0mm

POWERED BY ENTERA

POWERED BY **ENTERA**

DASH GLOW



DASH GLOW

Boost de colágeno para proporcionar um glow na pele!

Pacientes que apresentam interesse em promover o rejuvenescimento cutâneo, por meio de um estímulo potencializado da neocolagênese, podem se beneficiar da técnica **DASH DOT DASH**.

O protocolo consiste no tratamento da **face** com foco nas profundidades mais superficiais.

O objetivo principal é:

- Estimular neocolagênese
- Melhorar qualidade e viço da pele
- Suavizar linhas e rugas finas

Esse protocolo é interessante para pacientes com sinais de envelhecimento inicial, opacidade e textura irregular da pele, poros aparentes e leve desidratação associada à perda de função dérmica. Também oferece um olhar preventivo onde a estratégia primária não é o lifting.

POWERED BY **ENTERA**

DASH GLOW



DASH GLOW

Total de disparos	
Linha	-
Caneta	**4200 a 5600**

Caneta 2.0



Fronte	
Modo	•••
Level	**3 a 5**

Total Caneta Fronte	**100 a 200**
Hemiface Caneta Região Periorbital	**250 a 350**
Total Caneta Região Periorbital	**500 a 700**
Hemiface Caneta Região Perioral	**250 a 350**
Total Caneta Região Perioral	**500 a 700**

Caneta 2.0



Hemiface	
Modo	— • —
Level	**1 a 3**
Hemiface Caneta	**250 a 300**

Total Caneta	**500 a 600**

Caneta 2.0

Hemiface	
Modo	•••
Level	**3 a 5**
Hemiface Caneta	**250 a 300**

Total Caneta	**500 a 600**

Caneta 1.5



Fronte	
Modo	•••
Level	**3 a 5**

Total Caneta Fronte	**100 a 200**
Hemiface Caneta Região Periorbital	**250 a 350**
Total Caneta Região Periorbital	**500 a 700**
Hemiface Caneta Região Perioral	**250 a 350**
Total Caneta Região Perioral	**500 a 700**

Caneta 1.5



Hemiface	
Modo	— • —
Level	**1 a 3**
Hemiface Caneta	**250 a 300**

Total Caneta	**500 a 600**

Caneta 1.5

Hemiface	
Modo	•••
Level	**3 a 5**
Hemiface Caneta	**250 a 300**

Total Caneta	**500 a 600**

Dot	•••
Dash Dot Dash	— • —

POWERED BY **ENTERA**

POWERED BY **ENTERA**

DASH-SHAPE

DASH SHAPE

Umbigo triste

1900 a 3900

950 a 1900



820 a 1620

415 a 840



Modo Dash Dot Dash

PREGA CUTÂNEA	TECIDO ADIPOSO *Observar áreas com presença de fáscia de scarpa.	FÁSCIA MUSCULAR
10mm	1,5mm / 2,0mm / 3,0mm	4,5mm
20mm	1,5mm / 2,0mm / 3,0mm	7,0mm / 10mm
30mm	1,5mm / 2,0mm / 3,0mm	13mm

POWERED BY ENTERA

DASH SHAPE

Gordura abdominal



55 a 110



ou

820 a 1620



415 a 840



Modo Dash Dot Dash

ou

PREGA CUTÂNEA	TECIDO ADIPOSO *Observar áreas com presença de fáscia de scarpa.	FÁSCIA MUSCULAR
10mm	3mm / 4,5mm	4,5mm
20mm	3mm / 4,5mm / 7mm	7,0mm / 10mm
30mm	3mm / 4,5mm / 7mm / 10mm	13mm
40mm	3mm / 4,5mm / 7mm / 10mm	

DASH SHAPE

Braço

Régua P1

Liftera
RÉGUA CANETA
P1

820 a 1620

Modo Dash Dot Dash

Caneta 7.0

Posterior de Braço

Level	9 a 20
Total Caneta por profundidade	820 a 1620

Caneta 4.5

Posterior de Braço

Level	7 a 15
Total Caneta por profundidade	820 a 1620

Caneta 3.0

Posterior de Braço

Level	7
Total Caneta por profundidade	820 a 1620

ORIENTAÇÕES
1. Marcar área de tratamento
2. Realizar pinch test para escolha de profundidades (3 ou mais)
3. Iniciar do mais profundo para o mais superficial, seguindo orientações de potência de cada transdutor

POWERED BY ENTERA

DASH SHAPE

Flancos

Régua P1

820 a 1620

Modo Dash Dot Dash

Caneta 7.0

Flancos

Level	9 a 20
Total Caneta por profundidade	820 a 1620

Caneta 4.5

Flancos

Level	7 a 15
Total Caneta por profundidade	820 a 1620

Caneta 3.0

Flancos

Level 7	7
Total Caneta por profundidade	820 a 1620

ORIENTAÇÕES

1. Marcar área de tratamento
2. Realizar pinch test para escolha de profundidades (3 ou mais)
3. Iniciar do mais profundo para o mais superficial, seguindo orientações de potência de cada transdutor

POWERED BY **ENTERA**

DASH SHAPE

Flancos



55 a 110

Modo Dash Dot Dash

Linha 7.0

Flancos

Level	9 a 20
Total Linha por profundidade	55 a 110

Linha 4.5

Flancos

Level	7 a 15
Total Linha por profundidade	55 a 110

Linha 3.0

Flancos

Level	7
Total Linha por profundidade	55 a 110

ORIENTAÇÕES

1. Marcar área de tratamento
2. Realizar pinch test para escolha de profundidades (3 ou mais)
3. Iniciar do mais profundo para o mais superficial, seguindo orientações de potência de cada transdutor

POWERED BY **ENTERA**

DASH SHAPE

Culote

Régua P1

Liftera
RÉGUA CANETA
P1

820 a 1620

Modo Dash Dot Dash

Caneta 7.0

Culote

Level **9 a 20**	**9 a 20**
Total Caneta por profundidade	**820 a 1620**

Caneta 4.5

Culote

Level **7 a 15**	**7 a 15**
Total Caneta por profundidade	**820 a 1620**

Caneta 3.0

Culote

Level	**7**
Total Caneta por profundidade	**820 a 1620**

ORIENTAÇÕES
1. Marcar área de tratamento
2. Realizar pinch test para escolha de profundidades (3 ou mais)
3. Iniciar do mais profundo para o mais superficial, seguindo orientações de potência de cada transdutor

DASH SHAPE

Culote



55 a 110

Modo Dash Dot Dash

Linha 7.0



Culote

Level	7 a 20
Total Linha por profundidade	55 a 110

Linha 4.5



Culote

Level	7 a 15
Total Linha por profundidade	55 a 110

Linha 3.0



Culote

Level	7
Total Linha por profundidade	55 a 110

ORIENTAÇÕES

1. Marcar área de tratamento
2. Realizar pinch test para escolha de profundidades (3 ou mais)
3. Iniciar do mais profundo para o mais superficial, seguindo orientações de potência de cada transdutor

POWERED BY **ENTERA**

DASH SHAPE

Joelho

Régua P1

820 a 1620

ou

ou



55 a 110



PREGA	FLACIDEZ	TECIDO ADIPOSO
10mm	1,5mm / 2,0mm / 3,0mm	3,0mm / 4,5mm
20mm	1,5mm / 2,0mm / 3,0mm	3,0mm / 4,5mm / 7mm
30mm	1,5mm / 2,0mm / 3,0mm	3,0mm / 4,5mm / 7mm / 10mm
>40mm	1,5mm / 2,0mm / 3,0mm	3,0mm / 4,5mm / 7mm / 10mm

Modo Dash Dot Dash

ORIENTAÇÕES
1. Marcar área de tratamento
2. Realizar pinch test para escolha de profundidades (3 ou mais)
3. Iniciar do mais profundo para o mais superficial, seguindo orientações de potência de cada transdutor

POWERED BY **ENTERA**