Liftera™

POWERED BY ENTERA





Signature 2.0

ENTERA

Liftera™


www.liftera.com.br

@asterasysbrasil @asterasysbrasil



Indice

- André Braz | Ligament Lift
- Bruna Bravo | Jowl Contour
- Daniel Boro | Beyond Eye
- Fernando Macedo | 25 Minutes Lifting
- Isabela Pitta | Contour Lift
- Marcus Morais | Malar Lift
- Otávio Macedo - Bruno Lages | Slim Face
- Patrícia Ormiga | Immediate Lifting
- Sheila Mulatti | Full Face and Full Neck



Signature 2.0

Signature 2.0



Infinitas possibilidades. Uma assinatura única.

A medicina estética evolui quando tecnologia e conhecimento clínico evoluem juntos. Liftera amplia as possibilidades do médico, oferecendo liberdade para personalizar tratamentos, combinar técnicas e construir estratégias a partir de um olhar integrado sobre cada paciente.

No Signature 2.0, reunimos médicos renomados que levam essa versatilidade para a prática clínica. A partir de seu conhecimento, experiência e visão, cada profissional apresenta protocolos próprios, explorando diferentes formas de utilizar o Liftera, isoladamente ou em.combinação com outras abordagens.

São diferentes perspectivas, técnicas e possibilidades que revelam o potencial de uma tecnologia em constante evolução, capaz de acompanhar o médico e ampliar continuamente sua forma de tratar.

Liftera. A escolha inteligente que a sua pele faria por você.

Atenção

Este material tem caráter exclusivamente educacional e apresenta perspectivas, experiências e protocolos desenvolvidos pelos médicos convidados a partir de sua prática clínica.

ENTERA



Dr. André Braz

O **Dr. André Braz** é médico (CRM 52634239), membro da **Sociedade Brasileira de Dermatologia** e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica.

Dentre suas principais atuações, destaca-se como coordenador científico do **Curso de Anatomia Aplicada para Toxina Botulínica e Preenchimento do MARC (Miami Anatomical Research Center), Miami, Flórida, EUA.** Professor assistente do Setor de Cosmiatria no Serviço de Dermatologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro (PGRJ), além de palestrante em inúmeros congressos nacionais e internacionais.

É autor de diversos capítulos de livros e artigos científicos publicados em revistas médicas nacionais e internacionais de renome, tendo sido premiado por sua produção científica em inúmeros congressos realizados pelo mundo (Mônaco, França, Japão, EUA, Colômbia, Tailândia, entre outros).

É pioneiro no Brasil no conceito RFG (Rejuvenescimento Facial Global), precursor no tratamento de olheiras, do terço médio e inferior da face com implantes temporários.

Nome do protocolo:

Ligament Lift



Conceito: Integração estratégica entre tecnologias e terapias injetáveis, com o objetivo de potencializar resultados clínicos por meio de abordagens sinérgicas e complementares.

Descrição: Realizar disparos ultrassônicos bem próximos ao plano ósseo na região submentoniana, com o intuito de promover maior definição da linha mandibular e otimização do contorno do terço inferior da face.

Avaliação da Aplicação: Pacientes que apresentam flacidez e falta de definição do contorno do terço inferior da face.

Benefícios: Aprimoramento da definição do contorno mandibular e do terço inferior da face. Reposicionamento tecidual, contribuindo para a restauração da arquitetura facial e do contorno estrutural.

Pontos de Atenção: Evitar excesso de disparos com ponteiras de maior profundidade, a fim de preservar a integridade dos compartimentos adiposos e manter o equilíbrio volumétrico natural da região tratada.

Assinado por: Dr. André Braz


Tempo do protocolo: 40 minutos

Valor cobrado: R$ 7.500,00 (somente o Liftera)

Escaneie o QR Code e assista ao vídeo sobre o protocolo.

Dr. André Braz

Ligament Lift



Linha 4.5




Level **7 a 9**

Região
Retroligamentar

Disparos Por Hemiface
30 a 50

Total Linha
60 a 100



Linha 3.0



Level **4 a 6**


Região
Terço médio e Inferior

Disparos Por Hemiface
60 a 100

Total Linha
120 a 200

Dr. André Braz

Ligament Lift



Linha 4.5

Level **8 a 10**

Região
Submentoniana

Total Linha
30 a 50




Caneta 4.5

Level **8 a 10**

Região
Submentoniana

Total Caneta
600




Linha 3.0

Level **5 a 7**

Região
Submentoniana

Total Linha
30 a 50



Caneta 3.0

Level **5 a 7**

Região
Submentoniana

Total Caneta
600



Dra. Bruna Bravo

Dra. Bruna Bravo é médica dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD). É mestre em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e atualmente doutoranda em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Possui pós-graduação em Pesquisa Científica e Ensino Médico pela Harvard Medical School e atua como coordenadora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Rio de Janeiro (SBDRJ).

Nome do protocolo:

Jowl Contour



Dra. Bruna Bravo

Conceito: Protocolo voltado para promover lifting facial com ênfase no tratamento da região de jowl, visando reposicionamento dos tecidos e melhora da definição do contorno mandibular em pacientes com flacidez moderada.

Descrição: O protocolo associa aplicação com linha e caneta, utilizando múltiplas profundidades para atuação em diferentes planos teciduais. O tratamento prioriza a área retroligamentar e a região de jowl, atuando sobre tecido subcutâneo, SMAS e ligamentos faciais para favorecer reposicionamento e a melhora do contorno facial.

Avaliação da Aplicação: Indicado para pacientes com padrão facial regular (standard face), presença de jowl aparente e flacidez moderada.

Benefícios: Melhora da definição do contorno mandibular. Redução da aparência de jowl. Reposicionamento dos tecidos faciais. Efeito lifting e melhora da firmeza da pele.

Pontos de Atenção: Ajustar o nível de energia de acordo com a avaliação clínica do paciente. Respeitar os vetores de aplicação para otimizar o reposicionamento tecidual. Tracionar o local de aplicação para isolar a gordura do nervo marginal da mandíbula.

Assinado por: Dra. Bruna Bravo


Tempo do protocolo: 40 minutos

Valor cobrado: R$ 6.950,00

Escaneie o QR Code e assista ao vídeo sobre o protocolo.

Dra. Bruna Bravo

Jowl Contour



Linha 4.5

Level **7 a 9**

Região
Retroligamentar

Disparos Por Hemiface
45

Total Linha
90




Caneta 4.5

Level **7 a 9**

Região
Retroligamentar

Disparos Por Hemiface
600

Total Caneta
1.200



Linha 3.0

Level **7 a 9**

Região
Terço médio e inferior

Disparos Por Hemiface
90

Total Linha
180



Caneta 3.0

Level **7 a 9**

Região
Terço médio e inferior


Disparos Por Hemiface
600

Total Caneta
1.200

*Após a avaliação do tipo de pele do paciente, utilizar a Linha 2.0.

Dra. Bruna Bravo

Jowl Contour



Caneta 3.0

Level **3 a 7**

Região
Jowl

Disparos Por Hemiface
250

Total Caneta
500




Caneta 2.0

Level **3 a 5**

Região
Fáscia temporal superficial lateral

Disparos Por Hemiface
200

Total Caneta
400



Caneta 2.0

Level **3 a 5**

Região
Jowl


Disparos Por Hemiface
250

Total Caneta
500

*Deve-se tracionar a pele com o objetivo de atingir apenas a gordura, a fim de isolar o ramo marginal da mandíbula.

Dra. Bruna Bravo

Jowl Contour




Caneta 1.5

Level **3 a 5**

Região
Terço médio e inferior + Têmpora

Disparos Por Hemiface
800

Total Caneta
1.600



Caneta 1.5

Level **3 a 5**

Região
Jowl

Disparos Por Hemiface
250

Total Caneta
500

*Deve-se tracionar a pele com o objetivo de atingir apenas a gordura, a fim de isolar o ramo marginal da mandíbula.



Dr. Daniel Boro

Dr. Daniel Boro é graduado em Medicina pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-UNIFESP), onde também realizou residência médica em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica. Possui pós-graduação em DermatoCosmiatria pela Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) e fellowship em Cirurgia Órbito-Palpebral pela EPM-UNIFESP.

Atua com foco em procedimentos de Estética Avançada, tanto na área facial quanto corporal. Além da prática clínica, integra o corpo docente do Instituto Boggio e é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Nome do protocolo:

Beyond Eye



Conceito: Protocolo focado em elevação da cauda da sobrancelha, melhora da região periocular e tratamento da pálpebra inferior. A estratégia combina diferentes profundidades de disparo conforme avaliação clínica da contratilidade muscular, presença de rugas dinâmicas e bolsas prolapsadas.

Descrição: O protocolo trabalha em 3 níveis anatômicos, promovendo reconstrução estrutural do olhar. Muscular (contração e retração); Septo orbitário; e no plano cutâneo os septos dérmicos.

Avaliação da Aplicação: Indicado para pacientes com flacidez frontal, presença de rugas dinâmicas e alterações na qualidade ou espessura da pele na região superior da face. Também é recomendado para casos com bolsas infraorbitárias, alteração da contratilidade do músculo orbicular dos olhos e queda da sobrancelha relacionada ao vetor natural de ptose. A escolha da profundidade e da estratégia de tratamento deve considerar a anatomia individual de cada paciente.

Benefícios: Elevação da cauda da sobrancelha. Melhora do contorno orbital. Redução de bolsas palpebrais. Retração muscular controlada. Melhora da flacidez dérmica. Estímulo de colágeno.

Pontos de Atenção: Em pálpebra inferior, realizar aplicação com paciente olhando para cima. Controlar vetores de aplicação para evitar descentralização do resultado. Preservar a região do forame supra orbital devido ao nervo orbital. Realizar aplicação acima do rebordo ósseo.

Assinado por: Dr. Daniel Boro


Tempo do protocolo: 30 minutos

Valor cobrado: R$ 2.000,00

Escaneie o QR Code e assista ao vídeo sobre o protocolo.

Dr. Daniel Boro

Beyond Eye




Caneta 3.0

Level **7**

Região
Limbo lateral da íris até o canto lateral dos olhos

Disparos Por Hemiface
250

Total Caneta
500



Caneta 3.0

Level **7**

Região
Palpebra inferior

Disparos Por Hemiface
200


Total Caneta
400

***AVALIAÇÃO MUSCULAR:** **Se houver** contratilidade/ rugas dinâmicas, utilizar 3.0 mm
Se NÃO houver músculo significativo na área, utilizar apenas 1.5 mm

****Se houver bolsa / flacidez estrutural**

Dr. Daniel Boro

Beyond Eye




Caneta 1.5

Level **5**

Região
Limbo lateral da íris até o canto lateral dos olhos

Disparos Por Hemiface
250

Total Caneta
500




Caneta 1.5

Level **5**

Região
Têmpora

Disparos Por Hemiface
250

Total Caneta
500



Caneta 1.5

Level **5**

Região
Palpebra inferior

Disparos Por Hemiface
150

Total Caneta
300



Dr. Fernando Macedo

Dr. Fernando Macedo é graduado em Medicina pela Escola Paulista de Medicina (EPM) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), onde também realizou sua especialização em Dermatologia.

Atua de forma destacada na área e é membro de importantes sociedades médicas nacionais e internacionais, como a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), a American Academy of Dermatology (AAD) e o Grupo Brasileiro de Melanoma (GBM).

Nome do protocolo:

25 Minutes Lifting



Conceito: Protocolo desenvolvido para promover efeito lifting facial em aproximadamente 25 minutos, aplicável a diferentes faixas etárias e tipos de pele.

Descrição: O protocolo utiliza disparos distribuídos em toda a face, com foco estratégico em áreas de ancoragem, visando promover melhora da firmeza cutânea, estímulo tecidual e efeito lifting global.

Avaliação da Aplicação: Indicado para pacientes de diferentes idades, sexos e fototipos, mediante avaliação clínica individualizada.

Benefícios: Melhora da firmeza e qualidade da pele. Efeito lifting facial. Impacto positivo na percepção estética e autoestima do paciente.

Pontos de Atenção: Realizar avaliação individualizada para definição da indicação e escolha adequada das ponteiras. Considerar a sensibilidade e o limiar de desconforto do paciente durante o procedimento. Garantir uma experiência confortável e segura ao longo da aplicação.

Assinado por: Dr. Fernando Macedo

Tempo do protocolo: 25 minutos


Valor cobrado: $7.150,00

Escaneie o QR Code e assista ao vídeo sobre o protocolo.

Dr. Fernando Macedo

25 Minutes Lifting

Pele Fina



Linha 3.0

Level **6 a 7**

Região
Retroligamentar

Disparos Por Hemiface
15

Total Linha
30



Caneta 3.0

Level **7**

Região
Terço médio e inferior

Disparos Por Hemiface
300 a 400

Total Caneta
600 a 800



Caneta 2.0

Level **5**

Região
Perioral, periocular e parte medial


Disparos Por Hemiface
400 a 500

Total Caneta
800 a 1.000

Dr. Fernando Macedo

25 Minutes Lifting

Pele Fina



Linha 1.5



Level **5**

Região
Hemiface

Disparos Por Hemiface
40 a 50

Total Linha
80 a 100



Caneta 1.5



Level **5**

Região
Periorbital


Disparos Por Hemiface
150 a 250

Total Caneta
300 a 500

Dr. Fernando Macedo

25 Minutes Lifting

Pele normal/densa



Linha 4.5

Level **8 a 10**

Região
Retroligamentar

Disparos Por Hemiface
15

Total Linha
30




Caneta 4.5

Level **10**

Região
Retroligamentar

Disparos Por Hemiface
300 a 400

Total Caneta
600 a 800



Linha 3.0

Level **5 a 7**

Região
Terço Médio, Zigomática e temporal

Disparos Por Hemiface
40 a 50

Total Linha
80 a 100



Caneta 3.0

Level **7**

Região
Terço Médio, Zigomática e temporal

Disparos Por Hemiface
400 a 500

Total Caneta
800 a 1.000

Dr. Fernando Macedo

25 Minutes Lifting

Pele normal/densa



Caneta 2.0



Level **5**

Região
Perioral, periocular e parte medial

Disparos Por Hemiface
400 a 500

Total Caneta
800 a 1.000



Caneta 1.5



Level **5**

Região
Periorbital

Disparos Por Hemiface
150 a 250

Total Caneta
300 a 500



Dra. Isabela Pitta

Dra. Isabela Pitta é médica dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). É membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), além de atuar como speaker e palestrante na área de dermatologia estética.

Nome do protocolo:

Contour Lift



Conceito: Reposicionamento da face com promoção de efeito lifting e melhora dos contornos faciais.

Descrição: Protocolo de tratamento não invasivo baseado na aplicação de ultrassom microfocado de alta intensidade (Liftera), com atuação em múltiplos planos teciduais, desde o sistema músculo-aponeurótico superficial (SMAS) até camadas dérmicas mais superficiais. A técnica prioriza o tratamento das regiões ligamentares da face — incluindo os ligamentos zigomático cutâneo, massetérico e a linha ligamentar — estruturas fundamentais para a sustentação e manutenção da arquitetura tridimensional facial. Após a abordagem ligamentar, o protocolo segue para o tratamento do terço médio e inferior da face, com o objetivo de promover o reposicionamento biomecânico dos tecidos ptosados por meio de neocolagênese, neoelastogênese e remodelação da matriz extracelular, resultando em efeito global de lifting facial.

Avaliação da Aplicação: Indicado para pacientes com flacidez facial, especialmente em casos de emagrecimento ou com padrão facial heavy face.

Benefícios: Reposicionamento dos tecidos faciais. Efeito lifting não cirúrgico. Melhora da definição e dos contornos faciais.

Pontos de Atenção: Classificar corretamente o paciente no fluxograma de avaliação para definir a estratégia de tratamento mais adequada.

Assinado por: Dra. Isabela Pitta

Tempo do protocolo: 30 a 40 minutos

Valor cobrado: R$ 4.700,00 a 5.000,00

Escaneie o QR Code e assista ao vídeo sobre o protocolo.

Dra. Isabela Pitta

Contour Lift

Face Emagrecida




Caneta 3.0

Level **5 a 7**

Região
Ligamento Zigomático Cutâneo

Disparos Por Hemiface
500

Total Caneta
1.000



Caneta 3.0

Level **5 a 7**

Região
Linha Ligamentar

Disparos Por Hemiface
300

Total Caneta
600



Caneta 3.0

Level **5 a 7**

Região
Posterior à linha ligamentar


Disparos Por Hemiface
300

Total Caneta
600

Dra. Isabela Pitta

Contour Lift

Face Emagrecida



Linha 1.5




Level **3 a 5**

Região
Terco médio e inferior

Disparos Por Hemiface
60

Total Linha
120



Caneta 1.5



Level **3 a 5**

Região
Sulco nasogeniano, pré-jowl

Disparos Por Hemiface
500

Total Caneta
1.000



Caneta 3.0




Level **5 a 7**

Região
Submandibular

Disparos Por Hemiface
300

Total Caneta
600



Caneta 1.5



Level **3 a 5**

Região
Submandibular

Disparos Por Hemiface
300

Total Caneta
600

Dra. Isabela Pitta

Contour Lift

Heavy Face




Caneta 4.5

Level **12 a 15**

Região
Ligamento Zigomático Cutâneo

Disparos Por Hemiface
500

Total Caneta
1.000



Caneta 4.5

Level **12 a 15**

Região
Linha Ligamentar

Disparos Por Hemiface
500

Total Caneta
1.000



Caneta 4.5

Level **12 a 15**

Região
Posterior à linha ligamentar

Disparos Por Hemiface
500

Total Caneta
1.000

Dra. Isabela Pitta

Contour Lift

Heavy Face




Caneta 3.0

Level **5 a 7**

Região
Ligamento Zigomático Cutâneo

Disparos Por Hemiface
500

Total Caneta
1.000




Caneta 3.0

Level **5 a 7**

Região
Linha Ligamentar

Disparos Por Hemiface
300

Total Caneta
600



Caneta 3.0

Level **5 a 7**

Região
Posterior à linha ligamentar


Disparos Por Hemiface
300

Total Caneta
600

Dra. Isabela Pitta

Contour Lift

Heavy Face



Linha 4.5




Level **12 a 15**

Região
Terco médio e inferior + Gordura Nasogeniana

Disparos Por Hemiface
60

Total Linha
120



Caneta 4.5



Level **12 a 15**

Região
Terco médio e inferior

Disparos Por Hemiface
500

Total Caneta
1.000



Caneta 4.5



Level **12 a 15**

Região
Gordura nasogeniana


Disparos Por Hemiface
300

Total Caneta
600

Dra. Isabela Pitta

Contour Lift

Heavy Face



Linha 3.0




Level **5 a 7**

Região
Terco médio e inferior + Gordura Nasogeniana

Disparos Por Hemiface
60

Total Linha
120



Caneta 3.0




Level **5 a 7**

Região
Terco médio e inferior

Disparos Por Hemiface
500

Total Caneta
1.000



Caneta 3.0



Level **5 a 7**

Região
Gordura nasogeniana

Disparos Por Hemiface
300

Total Caneta
600

Dra. Isabela Pitta

Contour Lift

Heavy Face



Caneta 4.5



Level **12 a 15**

Região
Submandibular

Disparos Por Hemiface
500

Total Caneta
1.000



Caneta 3.0



Level **5 a 7**

Região
Submandibular

Disparos Por Hemiface
500

Total Caneta
1.000



Dr. Marcus Morais

Dr. Marcus Henrique de Alvarenga Morais é médico dermatologista com mais de 20 anos de experiência profissional, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e especialista em Dermatologia, com título reconhecido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e pela Associação Médica Brasileira (AMB).

Atua em Belo Horizonte, onde desenvolve atendimento voltado à dermatologia clínica, cirúrgica e estética, utilizando tecnologias modernas para prevenção do envelhecimento, tratamento de doenças da pele e procedimentos de harmonização e rejuvenescimento. Além da assistência aos pacientes, destaca-se pela participação ativa no ensino médico, sendo reconhecido como palestrante em congressos e eventos científicos no Brasil e no exterior.

Sua clínica, localizada no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, conta com equipe multidisciplinar focada em oferecer atendimento individualizado, baseado em evidências científicas e nas mais avançadas técnicas da dermatologia contemporânea.

Nome do protocolo:

Malar Lift



Conceito: Tratamento do terço médio da face com ênfase na região do malar mound, visando melhorar o contorno malar e reduzir edema e irregularidades locais.

Descrição: O protocolo associa o tratamento estático e pontual do ligamento com linha à aplicação dinâmica com caneta nas regiões malar, orbital lateral e zigomática. Em casos selecionados, pode-se associar bioestimulação com ácido poli-L-láctico nas regiões malar e temporal.

Avaliação da Aplicação: Indicado para pacientes com edema malar ou presença de malar mound, após avaliação do perfil e das características clínicas do paciente.

Benefícios: Uniformização da eminência malar. Redução do edema na região malar. Suavização da marcação da borda infraorbital. Melhora da definição dos ligamentos retentor orbital, orbital lateral e cutâneo zigomático

Pontos de Atenção: Em casos de edema malar, pode-se optar pelo tratamento apenas com caneta, sem necessidade de abordagem com linha. Na região periocular, é importante tracionar as pálpebras para que fiquem apoiadas no rebordo ósseo dos olhos e não direcionar a caneta para o globo ocular

Assinado por: Dr. Marcus Moraes

Tempo do protocolo: 15 minutos

Valor cobrado: R$ 2.000,00

Escaneie o QR Code e assista ao vídeo sobre o protocolo.

Dr. Marcus Morais

Malar Lift



Linha 3.0




Level **5**

Região
Malar lateral

Disparos Por Hemiface
3 a 6

Total Linha
6 a 12



Caneta 3.0




Level **7**

Região
Malar lateral

Disparos Por Hemiface
400

Total Caneta
800



Caneta 1.5



Level **7**

Região
Malar lateral

Disparos Por Hemiface
400

Total Caneta
800



Dr. Otávio Macedo

Dr. Otávio Macedo é graduado em Medicina pela Universidade de Taubaté e realizou residência em Dermatologia no Centro Hospitalar da Universidade Vaudois (CHUV), em Lausanne, na Suíça, e na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. É membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), membro fundador da Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia a Laser e integrante das academias Americana e Europeia de Dermatologia. Atua profissionalmente na área há mais de 40 anos.



Dr. Bruno Lages

Dr. Bruno Lages é graduado em Medicina pela Universidade Estadual do Piauí. Possui especialização em Dermatologia pela Santa Casa do Rio de Janeiro (Instituto Azulay), formação em Cirurgia Dermatológica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). É membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD).

Nome do protocolo:

Slim Face



Conceito: Protocolo desenvolvido para promover definição do contorno mandibular, melhora da papada e refinamento do terço inferior da face por meio do ultrassom microfocado Liftera. A técnica estimula neocolagênese e retração tecidual, contribuindo para a reorganização das estruturas de sustentação facial e melhora da harmonia do contorno facial.

Descrição: A aplicação é realizada de forma estratégica ao longo da linha mandibular, região submentoniana e áreas adjacentes do terço inferior da face. O protocolo utiliza cartuchos em diferentes profundidades para atuar tanto na flacidez cutânea quanto no tecido subcutâneo, promovendo a compactação dos tecidos, melhora do ângulo cérvico-mandibular e maior definição do contorno facial.

Avaliação da Aplicação: Indicado para pacientes que apresentam perda de definição mandibular, discreto acúmulo adiposo submentoniano e desejo de melhorar o contorno do terço inferior da face sem recorrer a procedimentos cirúrgicos. O protocolo é indicado especialmente para pacientes que buscam resultados naturais, com melhora da qualidade da pele e do desenho facial, respeitando a anatomia individual.

Benefícios: Melhora do contorno mandibular e do ângulo cérvico-mandibular. Redução da flacidez e do acúmulo na região de papada. Estímulo à produção de colágeno e elastina. Refinamento do terço inferior da face.

Pontos de Atenção: Garantir o correto posicionamento do transdutor e a escolha adequada da profundidade. Evitar sobreposição excessiva de disparos. Respeitar áreas de risco, como o trajeto do nervo marginal mandibular, e realizar avaliação clínica criteriosa antes do procedimento.

Assinado por: Dr. Otávio Macedo e Dr. Bruno Lages


Tempo do protocolo: 30 a 40 minutos

Valor cobrado: R$ 10.800,00


Escaneie o QR Code e assista ao vídeo sobre o protocolo.

Dr. Otávio Macedo
Dr. Bruno Lages

Slim face



Linha 7.0




Level **9 a 20**

Região
Submalar e jowl

Disparos Por Hemiface
60

Total Linha
120



Linha 4.5



Level **12 a 15**

Região
Terço inferior

Disparos Por Hemiface
150

Total Linha
300



Caneta 4.5



Level **12 a 15**

Região
Retroligamentar


Disparos Por Hemiface
800

Total Caneta
1.600

***Ponto de atenção!** Na primeira coluna pré-auricular, os disparos com a Linha de 4.5 deverão ser realizados somente em pacientes Heavy Face.

Dr. Otávio Macedo
Dr. Bruno Lages

Slim face



Linha 3.0




Level **7**

Região
Terco médio e inferior

Disparos Por Hemiface
150

Total Linha
260



Caneta 3.0



Level **7**

Região
Terco médio e inferior

Disparos Por Hemiface
1.200

Total Caneta
2.400

Dr. Otávio Macedo
Dr. Bruno Lages

Slim face



Caneta 4.5

Level **7 a 10**

Região
Submentoniana

Total Caneta
1.800




Caneta 3.0

Level **5 a 7**

Região
Submentoniana

Total Caneta
2.000



Caneta 1.5

Level **3 a 5**

Região
Submentoniana

Total Caneta
1.800



Dra. Patrícia Ormiga

Dra. Patrícia Ormiga é médica dermatologista, mestre em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e pela Associação Médica Brasileira (AMB).

É membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD) e da American Academy of Dermatology (AAD).

Realizou Research Fellow no Hospital Clínic de Barcelona e atuou como coordenadora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Rio de Janeiro (SBDRJ), na gestão 2021–2022.

Nome do protocolo:

Immediate Lifting



Conceito: Protocolo voltado para promoção de efeito lifting imediato, impactante e consistente na face.

Descrição: A técnica utiliza ultrassom microfocado com diferentes profundidades para atuar em múltiplos planos teciduais. Os transdutores de 4,5 mm e 3,0 mm são utilizados para atuação no SMAS facial e nos principais ligamentos de sustentação. De acordo com a espessura da gordura superficial, o transdutor de 3,0 mm também pode contribuir para redução do tecido adiposo. O transdutor de 1,5 mm é utilizado principalmente para promover contração da pele, podendo também atuar na região infraorbital, com repercussão sobre ligamento de retenção orbital e o ligamento zigomático facial, além do musculo orbicular dos olhos.

Avaliação da Aplicação: Indicado para pacientes com padrão facial regular ou round face que buscam melhora do efeito lifting e da firmeza facial.

Benefícios: Efeito lifting imediato e sustentado. Melhora da firmeza e sustentação facial. Estímulo de contração tecidual. Possível redução de gordura superficial em áreas selecionadas.

Pontos de Atenção: Na região lateral da face, é indispensável realizar uma avaliação clínica criteriosa para estimar a espessura da gordura subcutânea, orientando de forma precisa a escolha da profundidade e dos parâmetros de aplicação, a fim de garantir maior segurança e eficácia ao tratamento.

Assinado por: Dra. Patrícia Ormiga

Tempo do protocolo: 45 minutos


Valor cobrado: R$ 7.400,00

Escaneie o QR Code e assista ao vídeo sobre o protocolo.

Dra. Patrícia Ormiga

Immediate Lifting

Round face



Linha 4.5




Level **7 a 8**

Região
Terço médio e inferior

Disparos Por Hemiface
40

Total Linha
80



Linha 3.0




Level **4 a 5**

Região
Terço médio e Inferior

Disparos Por Hemiface
70

Total Linha
140



Caneta 3.0



Level **4 a 5**

Região
Submalar / Infrazigomática


Disparos Por Hemiface
300

Total Caneta
600

Dra. Patrícia Ormiga

Immediate Lifting

Round face




Linha 1.5

Level **2**

Região
Terço médio e inferior

Disparos Por Hemiface
30

Total Linha
60



Linha 1.5

Level **2**

Região
Labiomandibular, Sulco nasolabial, Periocular lateral, Frontal

Disparos Por Hemiface
90

Total Linha
180



Caneta 1.5

Level **2**

Região
Supralabial, Infraorbital, Roof/pálpebra superior em sua porção fora da órbita/ transição fronto-temporal


Disparos Por Hemiface
650

Total Caneta
1.300

Dra. Patrícia Ormiga

Immediate Lifting

Round face




Linha 4.5

Level **7 a 8**

Região
Submentoniana

Total Linha
20




Linha 3.0

Level **4 a 5**

Região
Submentoniana

Total Linha
15




Caneta 3.0

Level **4 a 5**

Região
Submentoniana

Total Caneta
800



Caneta 1.5

Level **2**


Região
Submentoniana

Total Caneta
800


Dra. Patrícia Ormiga

Immediate Lifting

Regular Face



Linha 3.0




Level **4 a 5**

Região
Terço médio e Inferior

Disparos Por Hemiface
70

Total Linha
140



Linha 1.5



Level **2**

Região
Terço médio e inferior


Disparos Por Hemiface
70

Total Linha
140

Dra. Patrícia Ormiga

Immediate Lifting

Regular Face



Linha 1.5




Level **2**

Região
Labiomandibular, Sulco nasolabial, Periocular lateral, Frontal

Disparos Por Hemiface
90

Total Linha
180



Caneta 1.5



Level **2**

Região
Supralabial, Infraorbital, Roof/pálpebra superior em sua porção fora da órbita/ transição fronto-temporal


Disparos Por Hemiface
650

Total Caneta
1.300

Dra. Patrícia Ormiga

Immediate Lifting

Regular Face



Linha 3.0



Level **4 a 5**

Região
Submentoniana

Total Linha
20




Caneta 3.0



Level **4 a 5**

Região
Submentoniana

Total Caneta
800



Caneta 1.5



Level **2**

Região
Submentoniana

Total Caneta
800



Dra. Sheila Mulatti

Dra. Sheila Mulatti é cirurgiã plástica, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com formação em Medicina, Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Realizou especialização em Rinoplastia no Hospital das Clínicas da FMUSP e construiu sua atuação com foco no rejuvenescimento facial cirúrgico e não cirúrgico, integrando diferentes abordagens para resultados naturais e individualizados.
É referência em tratamentos injetáveis e técnicas avançadas de rejuvenescimento facial, aliando sua experiência com toxina botulínica, preenchedores e bioestimuladores à cirurgia da face.

Sua trajetória é marcada pela busca constante por excelência técnica e atualização científica, além de uma forte atuação na educação médica, compartilhando sua experiência com profissionais no Brasil e internacionalmente.

Nome do protocolo:

Full Face and Full Neck



Conceito: Protocolo desenvolvido para proporcionar tratamento global da face e do pescoço, adaptado a diferentes perfis anatômicos, incluindo face e pescoço magros, normais ou pesados.

Descrição: O protocolo é estruturado por segmentação anatômica em três regiões: terço superior da face, terços médio e inferior da face e região de papada/pescoço. No terço superior, utiliza-se aplicação com linha e caneta de 1,5 mm. A abordagem é ajustada conforme o perfil do paciente (face magra, normal ou pesada) e as características do pescoço, permitindo personalizar a distribuição dos disparos e as profundidades.

Avaliação da Aplicação: Indicado para pacientes que necessitam de uma abordagem global da face e do pescoço, com adaptação do protocolo de acordo com o padrão facial (magro, normal ou pesado).

Benefícios: Tratamento completo da face e pescoço. Personalização conforme o biotipo facial. Melhora da firmeza e qualidade da pele. Harmonização global do contorno facial e cervical.

Pontos de Atenção: Classificar corretamente o paciente (face e pescoço magros, normais ou pesados) para definição da estratégia de aplicação.
Ajustar a distribuição dos disparos e profundidades de acordo com cada região tratada.

Assinado por: Dra. Sheila Mulatti

Tempo do protocolo: 40 minutos


Valor cobrado: R$ 8.500,00

Escaneie o QR Code e assista ao vídeo sobre o protocolo.

Dra. Sheila Mulatti

Full Face
and
Full Neck

Skinny face



Caneta 3.0




Level **7**

Região
Terço médio e inferior

Disparos Por Hemiface
800

Total Caneta
1.600



Linha 1.5



Level **5**

Região
Terço médio e inferior

Disparos Por Hemiface
40

Total Linha
80



Caneta 1.5



Level **5**

Região
Terço médio e inferior


Disparos Por Hemiface
1.000

Total Caneta
2.000

Dra. Sheila Mulatti

Full Face
and
Full Neck

Skinny face



Linha 1.5




Level **3**

Região
Terço superior

Disparos Por Hemiface
10

Total Linha
20



Caneta 1.5



Level **5**

Região
Terço médio e superior


Disparos Por Hemiface
400

Total Caneta
800

Dra. Sheila Mulatti

Full Face
and
Full Neck

Skinny face




Linha 1.5



Level **5**

Região
Pescoço

Total Linha
40



Caneta 1.5



Level **5**

Região
Pescoço

Total Caneta
1.200

Dra. Sheila Mulatti

Full Face
and
Full Neck

Standard face




Caneta 4.5

Level **9**

Região
Lateral à linha ligamentar

Disparos Por Hemiface
600

Total Caneta
1.200




Caneta 3.0

Level **7**

Região
Terço médio e inferior

Disparos Por Hemiface
600

Total Caneta
1.200




Linha 1.5

Level **5**

Região
Terço médio e inferior

Disparos Por Hemiface
40

Total Linha
80



Caneta 1.5

Level **5**

Região
Terço médio e inferior


Disparos Por Hemiface
1.000

Total Caneta
2.000

Dra. Sheila Mulatti

Full Face
and
Full Neck

Standard face



Linha 1.5




Level **3**

Região
Terço superior

Disparos Por Hemiface
10

Total Linha
20



Caneta 1.5



Level **5**

Região
Terço médio e superior

Disparos Por Hemiface
400

Total Caneta
800

Dra. Sheila Mulatti

Full Face
and
Full Neck

Standard face



Caneta 3.0

Level **7**

Região
Submentoniana

Total Caneta
600



Caneta 3.0

Level **7**

Região
Submentoniana

Total Caneta
1.200




Linha 1.5

Level **5**

Região
Pescoço

Total Linha
40



Caneta 1.5

Level **5**


Região
Pescoço

Total Caneta
1.200

Dra. Sheila Mulatti

Full Face
and
Full Neck

Heavy face



Linha 4.5



Level **9**

Região
Terco médio e inferior

Disparos Por Hemiface
30

Total Linha
60



Caneta 4.5




Level **9**

Região
Terco médio e inferior

Disparos Por Hemiface
600

Total Caneta
1.200



Linha 3.0




Level **5 a 7**

Região
Terco médio e inferior

Disparos Por Hemiface
21

Total Caneta
42



Caneta 3.0



Level **5 a 7**

Região
Terco médio e inferior


Disparos Por Hemiface
800

Total Caneta
1.600

Dra. Sheila Mulatti

Full Face
and
Full Neck

Heavy face




Linha 1.5

Level **5**

Região
Terço médio e inferior

Disparos Por Hemiface
40

Total Linha
80




Caneta 1.5

Level **5**

Região
Terço médio e inferior

Disparos Por Hemiface
1.000

Total Caneta
2.000




Linha 1.5

Level **3**

Região
Terço superior

Disparos Por Hemiface
10

Total Linha
20



Caneta 1.5

Level **5**

Região
Terço médio e superior


Disparos Por Hemiface
400

Total Linha
800

Dra. Sheila Mulatti

Full Face
and
Full Neck

Heavy Face




Caneta 7.0

Level **20**

Região
Submentoniana

Total Caneta
600



Caneta 4.5

Level **9**

Região
Submentoniana

Total Caneta
600

*Ultilizar caneta de 7.0mm somente quando houver gordura o suficiente.

Dra. Sheila Mulatti

Full Face
and
Full Neck

Heavy Face




Caneta 3.0



Level **7**

Região
Submentoniana

Total Caneta
1.200



Linha 1.5



Level **5**

Região
Pescoço

Total Linha
40



Caneta 1.5



Level **5**

Região
Pescoço

Total Caneta
1.200

